

FENOLOGIA

El cultivo se encuentra entre ahijado y máximo ahijado para la mayoría de las variedades.

PLAGAS

- **Aves:** Se observan daños causados por moritos, cigüeñuelas, cigüeñas, patos y daños más severos por el calamón común (gallo azul).
- **Pulgón:** su presencia va en aumento en el cultivo, tanto en variedades de grano largo como de grano redondo, realizándose tratamientos al superar umbrales en un 44,5% de la superficie.
- **Pudenta:** presencia en grama, rabo gato y otras adventicias, que están favoreciendo su entrada en el cultivo

MALAS HIERBAS

- **Echinocloa:** continúan los tratamientos, alcanzando una superficie total del 43%.
- **Arroz Salvaje:** las aplicaciones en variedades Clearfield alcanzan el 1,5% de la superficie.
- **Junquillo:** Continúan las aplicaciones. La superficie tratada asciende al 45%.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Temperaturas elevadas que favorecen el desarrollo del cultivo.

OBSERVACIONES

Continúan las escardas manuales.

RECORDATORIO DE PRÁCTICAS OBLIGATORIAS EN PRODUCCIÓN INTEGRADA

- Se recuerda que la comunicación de aplicación por medios aéreos debe realizarse con una semana de antelación.
- La Delegación de Agricultura ha autorizado la aplicación de herbicidas mediante pulverización los domingos 19 y 26 de julio.
- Se recomienda la eliminación de “rabo de gato” de las parcelas para prevenir la entrada de prudenta al cultivo.
- **Para mayor información consulte a su técnico.**

Fdo: *Equipo Técnico*