

BOLETÍN DE PRODUCCIÓN INTEGRADA

Nº 2
25-06-2020

SIEMBRA

El porcentaje de siembra se sitúa en el 100%.

FENOLOGIA

El cultivo se encuentra mayoritariamente entre las fases de emergencia y cinco hojas. Las siembras más avanzadas están en principio de ahijado.

PLAGAS

- **Quironómidos:** Presencia en muchas parcelas, si bien daño en el cultivo, por ahora, no es muy significativo.
- **Equinocloa:** presencia en las parcelas, se inician las aplicaciones con herbicidas
- **Junquillo:** presencia en primeras siembras.
- **Aves:** Se observan leves daños causados por flamencos, moritos, cigüeñuelas y algunos patos.
- **Para mayor información consulte a su técnico.**

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Continúa la presencia del viento, sobre todo a últimas horas de la tarde, y las temperaturas han sido elevadas.

RECORDATORIO DE PRÁCTICAS OBLIGATORIAS EN PRODUCCIÓN INTEGRADA

- Es obligatorio realizar la **nivelación con láser** al menos una vez cada tres años.
- Dosis máximas de abonado nitrogenado:
 - Tipo Indica: 165 UF de N/ha
 - Tipo Japónica: 145 UF de N/ha
- Emplear **semilla certificada**.
- Se recomienda sembrar inmediatamente después de la inundación inicial de las parcelas.
- Se prohíbe superar los 200 kg/ha en variedades tipo indica y 220 kg/ha en variedades tipo japónicas. Siendo las dosis de siembra recomendadas:
 - Tipo Indica: 165 Kg/ha
 - Tipo Japónica: 180 Kg/ha
 - Híbrida: 80 Kg/ha
- **Gusano Rojo y Algas:** Bajar los niveles de la lámina de agua.
- **Para mayor información consulte a su técnico.**

Fdo: Equipo Técnico