

FENOLOGIA

El cultivo se encuentra entre las fases de 2-3 hojas e inicio de ahijado en las siembras más tempranas.

PLAGAS

- **Quironómidos:** Presencia en muchas parcelas, aunque el daño en el cultivo no es significativo.
- **Efídridos:** Escasa presencia. Sin incidencia en el cultivo.
- **Aves:** Se observan leves daños causados por moritos, cigüeñuelas y patos.
- **Pulgón:** no se observa presencia en el cultivo

MALAS HIERBAS

- **Echinocloa:** continúan las aplicaciones en parcelas que superan el umbral de tratamiento. Se alcanza el 12% de la superficie. Se inicia la escarda manual.
- **Arroz Salvaje:** se inician aplicaciones en variedades Clearfield, alcanzando el 1% de la superficie.
- **Junquillo:** presencia generalizada.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Subida generalizada de temperaturas que favorecen el desarrollo del cultivo, aunque también provoca la quema de plantas en zonas más altas o parcelas con nivel bajo de la lámina de agua.

OBSERVACIONES

Se inicia la replanta.
Se observan daños de sal en finales de riego.

RECORDATORIO DE PRÁCTICAS OBLIGATORIAS EN PRODUCCIÓN INTEGRADA

- **Gusano Rojo y Algas:** Bajar los niveles de la lámina de agua.
- Se recuerda que la comunicación de aplicación por medios aéreos debe realizarse con una semana de antelación.
- No podrán realizarse aplicaciones de herbicidas mediante pulverización los domingos.
- Se recomienda la eliminación de “rabo de gato” de las parcelas para prevenir la entrada de pudenta al cultivo.
- **Para mayor información consulte a su técnico.**

Fdo: *Equipo Técnico*